

## **Kruidenrijk grasland Natuurzadenmengsel Droog Kuikenland Natuurzadenmengsel Vochtig**

### Handleiding Biodivers t.b.v. ontwikkeling van extensief kruidenrijk grasland (EKG) met een kruidenrijk grasland mengsel

- extensief kruidenrijk grasland inzaaien op gangbare grond heeft alleen zin als de opbrengst droge stof per ha per jaar niet hoger is dan 6 tot 7 ton;
- minimaal 1 groeiseizoen niet bemesten is een vereiste; Afhankelijk van de ontwikkeling wel of niet in het 2<sup>de</sup> jaar bemesten;
- geen kunstmest en drijfmest meer gebruiken en bij voorkeur en maximaal 10 ton ruige stalmest per ha / jaar
- eerste 2 jaar niet bemesten met vliegbagger;
- de beste manier van doorzaaien is brede stukken op het perceel inzaaien. Stroken grond beginnend aan de oostzijde van het perceel doorspitten en roteren en inzaaien en aanrollen met 4 gr/m<sup>2</sup>. Als de soorten bloeien en zaaien zullen deze het veld op natuurlijke wijze doorzaaien. Een wildere vorm van inzaaien (een sinus) mag ook maar is minder praktisch als je de rest van het perceel eerder wilt maaien en oogsten.
- bij inzaaien in het voorjaar pas in de zomer of nazomer voor de eerste keer maaien en afvoeren;
- in het eerste ontwikkelingsjaar niet beweiden; pas in het tweede ontwikkelingsjaar nabeweiden in de nazomer;
- bij inzaaien in de nazomer pas in het vroege voorjaar (april) voor de eerste keer maaien en afvoeren; bij heel gunstig nazomer weer de 1<sup>ste</sup> keer maaien in de late herfst;
- beste inzaai periode = augustus/september, de tweede inzaaiperiode loopt van ½ maart t/m eind april; de grond mag niet te droog zijn in augustus, oktober kan ook nog als het niet te nat is
- aantal maaibeurten per jaar minimaal 2x of maaien en nabeweiden. De eerste maaibeurt mag niet voordat de meeste soorten in rijp zaad staan. Dit is meestal eind juni of begin juli afhankelijk van de hoeveelheid zon en warmte in het seizoen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan soms 3x per jaar maaien nodig zijn, waarbij de eerste keer in april.